



Global Partners in Action: NGO Forum on Sexual and Reproductive Health and Development

ICPD@15 International Conference on
Population and Development

Berlin, Germany | 2-4 September, 2009

www.globalngoforum.org

Prevención en primer lugar: VIH/SIDA

En 1994, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), reconoció al VIH/SIDA como un problema global en aumento pero no como pandemia: el número total de casos en el mundo se estimó en ese momento en 2,5 millones. En 2007, las **muer**tes causadas por esta enfermedad alcanzaron casi esa cifra – 2,3 millones – y más de 33 millones de personas vivían con el VIH. Más de la mitad de éstas son mujeres.¹

La enfermedad se alimenta de la pobreza, la marginalización y la desigualdad social – particularmente la desigualdad de género – y del hecho de que los gobiernos han fallado en cumplir con su compromiso de 1994 con la CIPD de invertir fuertemente en las mujeres y los sistemas integrales de salud reproductiva. El financiamiento para los programas de prevención del VIH no es lo único que se necesita.

La situación actual

- > Se registra una mejoría en todos los 18 países más afectados por el SIDA, donde se cuenta con datos relacionados con cambios en los comportamientos clave (restringiendo las relaciones sexuales antes de los 15 años de edad, reduciendo el número las parejas, usando preservativos). Sin embargo, solamente dos (Camerún y Zambia) han mejorado las tendencias en los tres tipos de comportamientos.
- > Se ha observado un progreso considerable en todo el mundo para evitar la transmisión del VIH de madre a hijo en los casos en los cuales se cuenta con cifras de los últimos dos años,
 - o El porcentaje de mujeres embarazadas que viven con VIH y que recibieron medicamentos antirretrovirales para evitar la transmisión madre-hijo (PTMH) aumentó de 9 por ciento en el 2004 a 33 por ciento en el 2007.
 - o Entre los países más afectados, Botsuana, Namibia, Suazilandia y Sudáfrica han aumentado sus servicios de PTMH.
- > La cifra de las nuevas infecciones por VIH continúa superando las cifras de los tratamientos – por cada dos personas que reciben medicamentos antirretrovirales, otras cinco son infectadas. Ésta es una tendencia que no presagia nada bueno.
- > En 64 países inspeccionados, solamente el 40 por ciento de los jóvenes tienen conocimientos básicos correctos con respecto al VIH/SIDA, y los conocimientos de las mujeres jóvenes son aun menores que los conocimientos de los hombres jóvenes.
- > Entre 75 y 85 de cada 100 adultos VIH positivos fueron infectados a través de relaciones sexuales sin protección, y se calcula que las relaciones heterosexuales son la causa de más de 70 de cada 100 casos.
- > En África subsahariana, el 60 por ciento de todas las personas que viven con VIH ² son mujeres, así como también lo son el 76 por ciento de las personas jóvenes (edades entre 15 y 24) que viven con VIH.³

Agosto de 2009 |

Las opiniones expresadas en esta hoja informativa no representan necesariamente el punto de vista de una organización determinada.



Global Partners in Action: NGO Forum on Sexual and Reproductive Health and Development

ICPD@15 International Conference on
Population and Development

Berlin, Germany | 2-4 September, 2009

www.globalngoforum.org

- En otras regiones, los que corren más riesgos de una infección por VIH son los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los consumidores de drogas inyectables y los trabajadores sexuales y sus clientes. Algunos informes redactados después del año 2005 indican que los esfuerzos de prevención para estos grupos se habrían triplicado a nivel mundial.
 - La discriminación continúa constituyendo una barrera para que las poblaciones de mayor riesgo puedan acceder a métodos preventivos, pero los países que protegen a estas poblaciones de la discriminación tienden a alcanzar a un mayor número a través de programas de prevención del VIH.
- > Las normas relacionadas con los roles de género pueden evitar que las mujeres – y especialmente las mujeres jóvenes – reciban información y servicios sobre el VIH: pueden carecer de un acceso o control sobre los recursos; muchas veces tienen niños a su cargo, y su movilidad y su posibilidad de tomar decisiones podrían ser restringidas.
- > La violencia contra las mujeres (física, sexual y emocional), la cual es experimentada por entre un 10 y un 60 por ciento de las mujeres de todo el mundo entre las edades de 15 y 49 años, aumenta su vulnerabilidad ante el VIH.⁴
- La agresión sexual puede contribuir a la transmisión del VIH a través de las laceraciones ocurridas durante el uso de la fuerza.
 - Las mujeres que temen o viven experiencias violentas generalmente no pueden oponerse al sexo sin protección o solicitarle a su pareja que use preservativos. El miedo a la violencia puede también impedir que las mujeres conozcan y/o comuniquen su estado del VIH y busquen cómo tener acceso al tratamiento.

El compromiso de la CIPD

El Consenso de El Cairo hizo un llamado por una mayor atención en los programas de salud reproductiva para prevenir, detectar y tratar las infecciones transmitidas sexualmente, incluyendo el VIH; una capacitación especial para los que suministran atención a la salud, especialmente en cuanto a las necesidades de los jóvenes, y la inclusión de la educación y prevención del VIH como parte integral de los servicios de salud sexuales y reproductivos, junto con la promoción y distribución de preservativos de alta calidad como una parte esencial de este tipo de servicios.⁵

Áreas de acción

Es de primordial importancia que se realice en todo el mundo una ampliación de los programas de prevención del VIH.

- > Muchos programas nacionales de VIH/SIDA no tratan las desigualdades subyacentes como deberían hacerlo. En 2008, solamente un 52 por ciento de los países que presentaron un informe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas incluyeron un apoyo específico y presupuestado para mujeres enfocado en programas de VIH/SIDA.
- > Las reacciones ante la crisis económica mundial no deben incluir recortes en la financiación para programas de prevención del VIH.

Agosto de 2009 |

Las opiniones expresadas en esta hoja informativa no representan necesariamente el punto de vista de una organización determinada.



Global Partners in Action: NGO Forum on Sexual and Reproductive Health and Development

ICPD@15 International Conference on
Population and Development

Berlin, Germany | 2-4 September, 2009

www.globalngoforum.org

- > Los programas de VIH/SIDA deben dirigirse a estereotipos de género perjudiciales, trabajando también con hombres y niños para que cambien las normas relacionadas con la paternidad, la responsabilidad sexual, los derechos de la mujer, la toma de decisiones y la violencia, así como suministrando una educación sexual y sobre VIH/SIDA apropiada para la edad.
 - > Los programas deben encarar la violencia contra las mujeres ofreciendo una capacitación para negociar relaciones sexuales seguras y para adquirir destrezas para la vida diaria, apoyando a las mujeres que experimentan o temen a la violencia al revelar su estado de VIH, ofreciendo servicios médicos y legales integrales para las víctimas de violencia sexual y trabajando con los países para desarrollar, fortalecer y hacer respetar las leyes para eliminar la violencia contra la mujer.
 - > Los programas de VIH/SIDA deben recoger y utilizar una información puntualizada de acuerdo al género, edad y orientación sexual para lograr monitorear y evaluar el impacto de los programas sobre diversas poblaciones. Este tipo de información puede aumentar la habilidad de las partes interesadas clave para tratar las desigualdades de género, hacer más fácil la participación a los grupos de mujeres en general, de las mujeres que viven con VIH y de los jóvenes, y ayudar a asignar recursos para programas que tienen como objetivo la lucha contra la discriminación.
 - > Investigaciones recientes indican que los programas continuos e intensos que promueven cambios en el comportamiento y el uso de preservativos, una iniciación sexual tardía y menos parejas sexuales, tienen éxito en reducir la incidencia del VIH.
 - > Los programas deben aumentar el acceso a los preservativos tanto masculinos como femeninos, ya que éstos son en la actualidad el único método de fácil acceso para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual entre las personas sexualmente activas.
 - > La compra a los proveedores de los preservativos adicionales necesarios para prevenir la transmisión del VIH en África subsahariana costaría sólo alrededor de 263 millones de dólares por año, según los precios estándar del UNFPA.⁶
 - > La financiación debe ser previsible y sostenible, pues sólo así será posible luchar contra la pandemia del SIDA a largo plazo. Los objetivos para el 2010, definidos por país, indican que serán necesarios aproximadamente 25,1 mil millones de dólares para lograr alcanzar en 2010 una respuesta íntegra y global en los 132 países de ingresos bajos y medianos.⁷ Los datos indicados en esta página informativa son extraídos de ONUSIDA “Hechos y Datos Mundiales 2008”, hoja informativa del “Informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2008”, ONUSIDA, Ginebra, agosto de 2008, www.un.org.rs/organizations/24/20080715_fs_global_en.pdf (acceso el 17 de agosto de 2009) salvo cuando se señale específicamente otra fuente.
- ² OMS, *Gender inequalities and HIV*, http://www.who.int/gender/hiv_aids/en/ (acceso el 10 de agosto de 2009)
- ³ UNFPA, *Preventing HIV/AIDS: Protecting the Health of Women and Girls*, www.unfpa.org/hiv/women.htm (acceso el 10 de agosto de 2009)
- ⁴ OMS, *Gender inequalities...* (acceso el 10 de agosto de 2009)
- ⁵ UNFPA, “Resumen del Programa de Acción de la CIPD” <http://www.unfpa.org/icpd/summary.cfm> (acceso el 10 de agosto de 2009)
- ⁶ UNFPA, “Informe sobre el Apoyo de Donantes al Desarrollo de Anticonceptivos y Preservativos para la Prevención de ITS/VIH” UNFPA, Nueva York, 2007. Pág. 30, http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/796_filename_updated_donor_support_report.pdf (acceso el 17 de agosto de 2009)
- ⁷ ONUSIDA “Qué necesitan los países: las inversiones requeridas para alcanzar las metas de 2010”, ONUSIDA, Ginebra, 2009, Pág. 7 http://data.unaids.org/pub/Report/2009/JC1681_what_countries_need_en.pdf (acceso el 17 de agosto de 2009)

Agosto de 2009 |

Las opiniones expresadas en esta hoja informativa no representan necesariamente el punto de vista de una organización determinada.

Agosto de 2009 |

Las opiniones expresadas en esta hoja informativa no representan necesariamente el punto de vista de una organización determinada.